

Impact de l'épidémie COVID sur l'activité de dépistage des CeGIDDs Normands en 2020 : des leçons à tirer ?

Guillemette UNAL^{1,2}, Carine GUILLOIS¹, Louise LEGRAIN¹, Groupe épidémiologie³, Anaïs LESOURD^{1,3,4}, Manuel ETIENNE^{1,2,4}
 1- COREVIH NORMANDIE ; 2-DynamiCure (EA2656) ; 3-Groupe de travail « épidémiologie » des CeGIDD normands ; 4- Maladies infectieuses, CHU de Rouen

Introduction


La crise sanitaire a conduit en 2020 à interrompre les consultations sans rendez-vous en CeGIDD. En Normandie, une priorisation des rendez-vous par des secrétaires ou par motif dans doctolib ont été instaurées pour identifier les situations les plus urgentes : symptômes ou populations à haut risque d'Infection Sexuellement Transmissible (IST).

Objectif : identifier l'impact d'une priorisation des rendez-vous sur l'activité de dépistage des CeGIDD.


Méthode

Comparaison entre les années **2019** et **2020** de l'activité de **consultation** et de **dépistage** des **CeGIDD Normand** : caractéristiques du public accueilli, nombre de recours au dépistage, et taux de positivité des tests. Les caractéristiques du public accueilli et les taux de positivité ont été comparés par un test du chi² de Pearson.

Résultats



Principalement chez les usagers de moins 25 ans



Diminution de 17 % de l'activité de dépistage des CeGIDD

	VIH		VHB		VHC		Syphilis		Gonorrhée		Chlamydia	
Années	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
N dépistage	9716	7217	7897 *	5405*	7956	5634	8193	6241	9461	7390	9503	7416
N Positif	26	18	95 **	52 **	26	17	37	57	200	141	766	633
	0,27 %	0,25 %	1,2 %	0,96 %	0,3 %	0,3 %	0,45 %	0,91 %	2,1 %	1,9 %	8,1 %	8,5 %


* AgHBs seul ou associé à d'autres marqueurs
 ** Nombre de dépistages positifs pour l'AgHBs

Diminution de
 nombre de test de dépistage du VIH
 nombre de test de dépistage du pour le VHB
 nombre de test de dépistage du VHC
 nombre de test de dépistage de la syphilis
 nombre de test de dépistage de *Chlamydia* et gonocoque.

Stabilité des taux de positivité pour :
 VIH VHB VHC Chlamydia gonocoque
Augmentation de 0,5 % du taux de positivité pour la Syphilis (p < 0,001)

Conclusion

Pendant la crise sanitaire :
 Réduction de l'offre de dépistage en CeGIDD
 Accès privilégié aux plus symptomatiques.



Globalement moins de diagnostics d'IST MAIS
Taux de dépistage stables,
 aux dépens des plus jeunes usagers qui n'ont pu profiter de l'offre de prévention et d'éducation à la santé sexuelle.

Augmentation des diagnostics de syphilis = conséquence des consultations ciblées
OU reflet d'une incidence toujours croissante de cette infection.