

# LES JEUNES, UNE POPULATION PARTICULIÈREMENT EXPOSÉE AUX IST ?

A.LESOURD (1,3,4), G.UNAL (1,2), Groupe épidémiologie (3), L.LEGRAIN (1), M.ETIENNE (1,2,4)

(1) COREVIH NORMANDIE, (2) DynamiCure (EA2656), (3) Groupe de travail « épidémiologie » des CeGIDD normands, (4) Maladies infectieuses, CHU de Rouen

## Introduction

Les infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes représentent un lourd fardeau à l'échelle internationale, notamment chez les jeunes adultes. En France, Santé Publique France a tiré la sonnette d'alarme en 2018 rapportant une multiplication par trois du nombre d'IST entre 2012 et 2016 chez les 15-25 ans<sup>1</sup>. Notre objectif était de décrire l'épidémiologie actuelle des IST chez les jeunes dans la région Normande.

## Méthode

Recueil exhaustif des données anonymisées de l'ensemble des usagers ayant consulté au cours de l'année 2020 dans un CeGIDD normand et âgés ≤ 25 ans, via un logiciel métier commun à tous les CeGIDD.


## Motifs de consultation

	≤ 25 ans	> 25 ans
Dépistage systématique	n = 4536 (98%)	n = 3242 (90%)
IST symptomatique	n = 116 (2,5%)	n = 82 (2,3%)
Accident d'exposition viral	n = 14 (0,3%)	n = 20 (0,6%)
PrEP	n = 21 (0,45%)	n = 256 (7,1%)

## Résultats

8349 usagers accueillis en 2020 dont 4615 âgés ≤ 25 ans (55%)

## Répartition par classe d'âge




## Taux de positivité

	≤ 25 ans	> 25 ans
<b>Chlamydia</b>	<b>10,2% (n = 441/4312)</b>	6,1% (n = 189/3084)
<b>Gonocoque</b>	1,8% (n = 79/4308)	2% (n = 61/3079)
<b>Syphilis</b>	0,7% (n = 23/3351)	1,2% (n = 35/2822)
<b>VHB</b>	0,43% (n = 14/3241)	1,9% (n = 38/2134)
<b>VHC</b>	0,2% (n = 5/3135)	0,5% (n = 12/2423)
<b>VIH</b>	0,15% (n = 6/4122)	0,4% (n = 12/3058)



## Proportion des ≤ 25 ans sur l'ensemble des patients dépistés en CeGIDD en 2020



## Conclusion

Les jeunes représentent une population particulièrement exposée au risque d'IST bactériennes probablement en lien avec divers facteurs de vulnérabilités.

Le dépistage systématique des jeunes ≤ 25 ans reste d'actualité : taux de positivité élevés (chlamydiae, gonocoque) alors que la majorité de ces usagers sont asymptomatiques.

Les CeGIDDs normands semblent être une structure bien identifiée par cette population et ont donc un rôle clé à jouer dans la prévention des ces IST.

Attention à ne pas méconnaître les infections virales; les jeunes de moins de 25 ans représentent 13% des nouveaux dépistages VIH et 10% des PPVIH en France<sup>2</sup>.