

Echecs / Arrêts de traitement ARV à Rouen

Patients ayant interrompu traitement ARV injectable

N = 4 (9%)

Âge moyen 56,5 ans (52 - 62)

1 F hétéro– 3 H HSH

Pays de naissance : France

Année de découverte du VIH : 1996, 2011, 2014 et 2015

Lignes de traitement précédentes :

KIVEXA/ISENTRESS

ODEFSEY

JULUCA

KIVEXA/INTELLENCE

Motifs d'arrêt

1 / Effet secondaire neurologique

2/ Effet secondaire ostéo-articulaire

3/ ?

4 / Décision du patient

Patient 1 / Effet secondaire neurologique

Mauvais vécu de la première injection de traitement ARV

Quelques heures après :

- Douleurs musculaires
- Asthénie
- Paresthésies des membres inférieurs

Infection VIH 1996

CV VIH < 30 cp/ml

CD4 1073/mm³

EMG et IRM lombaires sans anomalies

Reprise du traitement antérieur par KIVEXA / ISENTRESS

A 3 mois de l'arrêt : persistance de douleurs atypiques dysesthésiques au niveau des pieds

Patiente 2 / Effet secondaire ostéoarticulaire

2 injections M0 et M1

Début des symptômes un mois après la seconde injection :

Myalgies

Arthralgies des 4 extrémités

Asthénie

Infection VIH 2011

CV VIH < 30 cp/ml

CD4 1137/mm³

A 1 mois du relai par ODEFSEY (3 mois après dernière injection) :

Disparition complète des myalgies, arthralgies et asthénie

Reprise ODEFSEY

Patient 4/ Décision du patient

Arrêt du traitement à M10 (6 injections au total)

Absence d'amélioration de céphalées antérieures au traitement

Prise de 13 kg

Reprise ancien traitement par KIVEXA/ISENTRESS

Infection VIH 2013

CV VIH < 30 cp/ml

CD4 /mm³